

IHADA

治療ケア

皮膚炎 かゆみに効く



キュアロイド軟膏（顔*・からだ用） 幼児から使えます

患部で効き
体内で分解される

アンテドラッグステロイド



テカらない
軟膏タイプ

*顔面には広範囲に使用しないでください

5g

第2類医薬品

IHADA

イハダ キュアロイド軟膏 5g

第2類医薬品

- 炎症をすばやく鎮め、皮膚炎、湿疹、かゆみを治します
- テカリ、べたつきを抑えた軟膏タイプで患部を保護します
- 無香料・無着色

〔適応症〕 皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

〔成分・分量〕 (1g中)

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル1.5mg、ジフェンヒドラミン10mg、イソプロピルメチルフェノール1mg、リドカイン10mg、トコフェロール酢酸エステル5mg

添加物として、白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、パルミチン酸セチル、パラフィン、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パルミチン酸デキストリンを含有します。 C1



イハダの詳しい
情報はこちらから



〔5つの有効成分〕

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(炎症を鎮める)
ジフェンヒドラミン・リドカイン(かゆみを鎮める)
イソプロピルメチルフェノール(殺菌消毒)
トコフェロール酢酸エステル(血行促進)

〔用法・用量〕 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〔用法・用量に関連する注意〕 (1)患部を清潔にした後、塗布してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

〔保管および取扱い上の注意〕 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

こんな症状に。


- ☑ かゆみがつらく、何度も繰り返す
- ☑ 炎症をおこし赤く腫れている
- ☑ かぶれてポロポロ皮がめくれる

アンテドラッグ
ステロイドとは？

患部で優れた抗炎症効果を
発揮し、体内ではステロイド
成分が分解されて低活性に
なるステロイドです。

患部でよく効く

プレドニゾン
吉草酸エステル
酢酸エステル



体内では分解されて低活性！

ご使用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 1. 次の部位には使用しないでください。（1）水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部 （2）目の周囲、粘膜等 2. 顔面には広範囲に使用しないでください。3. 長期連用しないでください。



相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。（1）医師の治療を受けている人 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人 （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 （4）患部が広範囲の人 （5）湿潤やただれのひどい人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5
お客さま窓口 ☎ 0120-81-4710
製造販売元 ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168
MADE IN JAPAN

※製造記号、使用期限はケース側面に記載しています。



ミックス

木材 | 責任ある森林
管理を支えています

FSC® C003630



ケース
台紙

セルフメディケーション

税 控除 対象



49 09978 20447 1

▶ OPEN