

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月
2012年9月
(記載要領変更に伴う改訂)

ソラシドン[®]

乗物酔い薬

第2類医薬品

ソラシドン[®]は乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和を目的とする乗物酔いの薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる

1 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

2 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

（眠気等があらわれることがある。）



相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ① 医師の治療を受けている人。
- ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ④ 次の症状のある人。
排尿困難
- ⑤ 次の診断を受けた人。
緑内障

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
泌 尿 器	排尿困難

3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

口のかわき、眠気

裏面もお読み下さい→

用法・用量

年齢	1回量	服用回数
成人15歳以上	2錠	1日1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しない×	

ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用して下さい。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

・錠剤の取り出し方：


右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和




成分・分量

成分	成人1日量(2錠)中
塩酸メクリジン	50mg

添加物として、D-マンニトール、セルロース、カルメロースNa、硬化油、ステアリン酸Mg、I-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

製造販売元：明治薬品株式会社お客様相談室

電話：☎0120-53-3451

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：052-951-2340

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元



明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地