

※2021年4月 改訂

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



頭皮湿疹などの治療薬

メンソレータム。

メディクイック H

湿疹・かぶれの治療薬 第II類医薬品

販売名：メンソレータム® メディクイック® H

メンソレータム® メディクイック® Hは、
かゆみ・ぶつぶつなど、頭皮湿疹のつらい症状を
しっかり抑えて治す治療薬です。

こんな時におすすめです


つらい
かゆみ

ぶつぶつや
赤み

整髪料などによる
かぶれ

頭皮湿疹とは.....

頭皮湿疹とは、髪の毛で覆われた頭部、髪の毛の生え際などにみられる湿疹です。原因は、皮脂、汗、ストレスや環境因子など様々ですが、早く治すにはがまんせずに「効く」治療薬で症状を抑えすることをおすすめします。



メンソレータム® メディクイック® Hの特長

かゆみ・炎症によく効くアンチドラッグステロイド*配合

*治療効果と安全性の両立を目的として開発されたステロイドです。

- 高い消炎効果で炎症・かゆみをしっかり鎮めます。
- 患部でよく効いて体内で分解します。



頭皮にも使いやすいリキッドスプレー

- 患部にダイレクトにスプレーできます。
- べたつかない透明リキッドですので髪の毛についても気になりません。

治療のコツ

- ◎頭皮に湿疹ができやすい方は、頭皮をいつも清潔な状態に保ちましょう。
ただし、乾燥もかゆみの原因になりますので、シャンプーのし過ぎは控えましょう。
- ◎少量ずつこまめに塗りましょう。一度に大量にまとめ塗りしても効果が上がるものではありません。
- ◎症状が治まってきたら使用回数を徐々に減らしていきましょう。

- 症状のない部位には使用しないでください。
- 症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶり返す方は、医師に相談されることをおすすめします。

使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等
または化膿している患部
(2)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にて相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊娠または妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にて相談ください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------------|--------------------------------|
| 皮 フ | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
| 皮 フ (患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にて相談ください。

■効能・効果

湿疹、皮炎、かゆみ、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

■用法・用量*

1日数回、適量を患部に噴霧してください。
顔には適量を手にとり塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用にのみご使用ください。
5. ラップフィルム等の通気性の悪いもので、おおわないのでください。



■成分・分量

| 有効成分 | 分量(1g中) | 作用 |
|--|---------|-------------|
| ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド) | 1.5mg | 炎症をしっかりと鎮める |
| クロタミトン | 50mg | かゆみを抑える |
| イソプロピルメチルフェノール | 1mg | 患部を殺菌 |
| リ-メントール | 10mg | 清涼成分 |

添加物として、エタノール、1,3-ブチレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、BHTを含有する。

■保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)本剤はアルコール類を含むため、メガネ、アクセサリー類、時計、寝具、家具、床、化織製品、プラスチック類、皮革製品などにつかないように十分ご注意ください。(材質によっては落ちにくいくことや変色することがあります)
- (6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (7)火気に近づけないでください。

お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1