

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう保管してください。



メンソレータム®

カユピット®_b

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

顔のかゆみが起こる原因の一つは、肌のバリア機能が弱まり、外部刺激を受けやすくなっているから。

「メンソレータム®カユピット®_b」は、

4つの有効成分がかゆみ・湿疹などの症状にしっかり効く治療薬です。きちんと治すことで、バリア機能の正常化につながります。

4つの有効成分配合 ~かゆみにすばやく効く~

ジフェンヒドラミン塩酸塩

かゆみの原因に作用

アラントイン

赤み・炎症を抑え、皮膚の修復促進

リドカイン

かゆみを鎮める

グリチルリチン酸二カルシウム

赤み・炎症を抑える



かゆみ・赤みなどのトラブル肌

イメージ図

デリケートな顔に7つのこだわり処方

デリケートな顔のかゆみだからこそ、患部につかやすい処方設計。マイクロワセリンクリームでしっとりやさしい使い心地。

- ✓非ステロイド
- ✓ノンメントール
- ✓弱酸性
- ✓無香料
- ✓尿素無配合
- ✓アルコールフリー
- ✓無着色



ここもポイント

目のまわり、口のまわりにも使える

メイクがヨレにくい

(目に入らないよう、ご使用ください)



しっとり
クリームタイプ



花粉かぶれ
マスクかぶれにも

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、ただれ、あせも、虫さされ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

成分・作用(1g中)

有効成分	配合量	作用
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	かゆみの原因に働きます。(抗ヒスタミン作用)
リドカイン	5mg	かゆみをすばやく鎮めます。(局所麻酔作用)
アラントイン	2mg	赤み・炎症を抑え、皮膚の修復を促します。(消炎・修復作用)
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	赤み・炎症をおさえます。(消炎作用)

添加物として、ワセリン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンアラキルエーテル、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジメチルポリシロキサン、クエン酸、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N'-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、パラベン、水添大豆リン脂質、エドト酸Na、クエン酸Naを含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1