

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# リザル

第2類医薬品

## 解熱鎮痛薬

### 〔特徴〕

- ・鎮痛・解熱成分に、それらの働きを助ける成分を配合し、頭痛、生理痛、神経痛などの痛みを和らげ、熱を下げます。
- ・さわやかな香りのあるのみやすいカプレット型の淡青色の錠剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがある。）

#### 4. 服用前後は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

眠気

4.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効 能〕

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

## 〔用法・用量〕

次の量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人 (15歳以上)	2錠	2回を限度としてください。 服用間隔は6時間以上あけてください。
7歳～14歳	1錠	
7歳未満	服用しないでください。	



### <用法及び用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)用法・用量を厳守してください。
- (3)錠剤の取り出し方

(PTPシートの取り出し図)

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。



## 〔成 分〕

4錠(成人の1日最大服用量)中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
エテンザミド	1,000mg	
アリルイソプロピルアセチル尿素	120mg	痛みをおさえる働きを助けます。
無水カフェイン	240mg	頭痛を和らげます。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、青色2号、 $\ell$ -メントール、ハッカ油

## 〔保管および取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## 〔包 装〕

16錠(カプレット)

本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ダイト株式会社 安全管理室 お客様相談係

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル 電話(03)5294-7147  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)