

開け口

フジアロー[®]スマイルド

(鎮痒消炎薬)

商品詳細へ

第2類医薬品



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
- (5) 液もれを防ぐためキャップをしっかり閉めてください。

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



家族みんなで使える

フジアロー[®]スマイルド

虫さされ かゆみ あせも

ジフェンヒドラミン塩酸塩配合
非ステロイド剤



サツと塗れる
液体タイプ

[液剤] 50mL

セルフメディケーション
税 控除 対象

富士薬品

第2類医薬品

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。

成分・分量 <100g中>

| | |
|--------------|------|
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 2.0g |
| パンテノール | 1.0g |
| ジブカイン塩酸塩 | 0.1g |

添加物: グリセリン、ヒプロメロース、エデト酸Na水和物、ベンザルコニウム塩化物、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物 含有



4 987524 106219