

総合かぜ薬 コルゲンコーワかぜ錠

⚠ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

① 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)

④ 服用前後は飲酒しないでください

⑤ 長期連用しないでください

▢ [相談すること]

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人は。(4)高齢者。(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)次の症狀のある人。 高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脉炎)、血栓症を起こすおそれのある人

② 服用後、次の症狀があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口のかわき、眼気
 ④5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、発熱、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

下記の量を食後なるべく30分以内に、水又はお湯で、かまざに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠 ○○○	3回
11歳以上15歳未満	2錠 ○○	
6歳以上11歳未満	1錠 ○	
6歳未満の幼児	×服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>


- ①用法・用量を厳守してください。
 ②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(9錠中)

●アセトアミノフェン 900mg ●トラネキサム酸 420mg ●d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ●デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg ●dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ●無水カフェイン 75mg
 ●ヘスペリジン 60mg [添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、セルロース、ステアリン酸Mg
 <成分・分量に関連する注意>本剤に含まれるヘスペリジンにより、錠剤表面に斑点がみられることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
 ②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。
 (誤用の原因になったり品質が変わります。) ④水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりするがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
 誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。⑤ビンの中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。⑥ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。⑦使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



発売元 横和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元 中外医薬生産株式会社 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5