

内服
ボラギノール®EX

あけ口

第2類医薬品
痔疾用内服薬

効能・効果: 次の場合の症状の緩和: 痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血
用法・用量: 次の量を食後に、水又はぬるま湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守すること。

成分・分量
9錠(2.7g)中以下エキス 1.5g

オウバク 0.30g、カンゾウ 0.95g、
コウカ 1.35g、サイコ 1.35g、
ショウマ 1.35g、ソウジュン 2.0g、
ダイオウ 0.35g、チンピ 0.50g、
トウキ 0.675g、トウニン 0.675g

添加物: 軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース

▲使用上の注意

❌してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 高齢者。
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。下痢(8)次の医薬品を服用している人。瀉下薬(下剤)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気、嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

製造番号

使用期限

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることがありますが、効果に変わりはありません。

この箱は本剤とともに保管し、服用の際によくお読みください。

内服 ボラギノール®EX

第2類医薬品

45錠

痔の原因となる

血流を改善

10種類の生薬配合

内服 いぼ痔・きれ痔・痔出血に
ボラギノール®EX

45錠 第2類医薬品 15歳以上

外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください。

いぼ痔・きれ痔
痔出血に



錠剤

1回3錠 1日3回

内服
ボラギノール®EX

痔の原因となる

血流を改善

10種類の生薬配合

痔の症状を緩和

BORRAGINOL EX ORAL is hemorrhoidal preparation containing 10 types of crude drug extract.

45錠

第2類医薬品

天藤製薬お客様相談係 ☎0120-932-904
受付時間 9:00~17:00(土、日、休、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 987978 101105



D1

10種類の生薬配合

内服
ボラギノール®EX

痔の原因となる

血流を改善

45錠

第2類医薬品

製品について
こちら



販売元
天藤製薬株式会社
大阪府豊中市
新千里東町一丁目5番3号
製造販売元
劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号